



REABILITAÇÃO ORAL POR MEIO DE PRÓTESE TOTAL IMEDIATA SUPERIOR CARACTERIZADA: UM RELATO DE CASO.

¹ Adriele de Jesus Soares da COSTA; ¹ Luise Martins da SILVA ; ¹ Yana Bitencourt da Costa;
¹ Felipe Vieira das Neves; ² Luana Gomes FERNANDES; ³ Franklin Barbosa da SILVA;

1 Graduando em Odontologia pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA;

2 Graduada em Odontologia pela Universidade Nilton Lins- UNL;

3 Doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo – USP.

Área temática: PRÓTESE DENTÁRIA

Modalidade: RELATO DE CASO

E-mail dos autores: adjsdc.odo21@uea.edu.br¹; lmads.odo21@uea.edu.br¹; ¹
ybdc.odo21@uea.edu.br; ¹ fvdn.odo21@uea.edu.br; ² luanagmsf@gmail.com;
fsilva@uea.edu.br³;

RESUMO

O edentulismo era considerado uma condição fisiológica, visto que afeta principalmente os idosos, mas sabe-se que o verdadeiro motivo é a falta de informação sobre Higiene oral, doenças e traumatismos.¹ A perda dos dentes dificulta as funções orais, como na mastigação em que a realização dos cortes dos alimentos torna-se deficiente gerando, consequentemente, um estado nutritivo ruim.^{3,4} Assim, esses indivíduos necessitam de reabilitação oral, visando melhorar qualidade de vida e convívio social, através de prótese, seja total, parcial ou unitária.^{1,3} Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de reabilitação oral através de uma prótese total imediata superior e prótese parcial removível inferior, ambas caracterizadas. O relato descreve uma paciente do sexo feminino, 56 anos, que compareceu a Policlínica Odontológica da Universidade Nilton Lins, relatando insatisfação com a estética e dor durante a alimentação. No exame clínico observou-se a presença dos dentes 18, 28, 33, 43 e 38 e má adaptação das próteses. Após a análise radiográfica panorâmica e modelos de estudo, o tratamento proposto foi a exodontia dos dentes superiores seguida pela instalação da prótese total imediata e prótese parcial removível inferior, visando otimizar estética. Seguiu-se o protocolo de confecção das próteses com o preparo de boca II, selamento periférico, moldagem funcional, confecção da estrutura metálica, da base de prova e dos planos de orientação, montagem no articulador semiajustável,



montagem dos dentes, escolha da gengiva artificial pelo sistema Tómas Gomes, acrilização, exodontia dos dentes 18 e 28, instalação, recomendações pós-operatórios e consultas de acompanhamento. A confecção das próteses associada à técnica de caracterização da gengiva artificial promoveu resultado satisfatório para a paciente, devolvendo função, estética e confiança em seus relacionamentos pessoais e profissionais. A prótese total imediata superior é essencial na reabilitação oral, restaurando estética e função mastigatória logo após a extração dos dentes.

Palavras-chave: Prótese total imediata, reabilitação bucal, grampos dentários.

REFERÊNCIAS:

1. Agostinho ACMG, Campos ML, Da Silveira JLGC. Edentulismo, uso de prótese e autopercepção de saúde bucal entre idosos. Rev Odontol UNESP. 2015 mar-apr.; 44(2): 74-9.
2. Bessadet M, Nicolas E, Sochat M, Hennequin M, Veyrune J-L. Impact of Removable partial denture prosthesis on chewing efficiency. J Appl Oral Sci. 2013; 3. 21(5)
3. Melania OMA, Preoteasa CT, Preoteasa E. Masticatory function parameters in Patients with removable dental prosthesis. J Med Life. 2019 jan-mar.; 12(1): 43-8.