



REABILITAÇÃO ESTÉTICO-FUNCIONAL POR MEIO DE PRÓTESES REMOVÍVEIS: RELATO DE CASO.

¹Maria Eduarda Santos da Silva ROLIM; ¹Maria Sinele Ribeiro BRILHANTE; ¹Luise Martins da SILVA; ²Wanneson Mendes COSTA; ³Ana Caroline Farias BONFIM; ⁴Franklin Barbosa da SILVA.

1 Graduando em Odontologia pela Universidade do Estado do Amazonas–UEA;

2 Especialista em Prótese Dentária pela Universidade Nilton Lins–UNINILTON;

3 Especialista em Prótese Dentária pela Faculdade São Leopoldo Mandic/SP–SLMANDIC;

4 Doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo–USP.

Área temática: PRÓTESE TOTAL.

Modalidade: RELATO DE CASO.

E-mail dos autores: mesdsr.odo21@uea.edu.br¹; msrb.odo21@uea.edu.br¹; lmds.odo21@uea.edu.br¹; mendeswanneson18@gmail.com²; carolbonfim@hotmail.com³; fsilva@uea.edu.br⁴.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A odontologia estética tem se destacado na atualidade pela maior demanda de pacientes com perdas dentárias procurando restabelecer padrões não somente funcionais, mas também estéticos^{1,2}. Diante disso, em busca de reverter essas alterações, as reabilitações podem ser realizadas com próteses totais (PT), próteses parciais removíveis (PPR) e fixas sobre dentes ou implantes^{3,4}. **OBJETIVO:** Relatar em um caso clínico a reabilitação estético-funcional por meio de próteses removíveis. **MÉTODOS:** Paciente 63 anos, gênero feminino, compareceu a clínica odontológica de uma universidade queixando-se da estética do sorriso. A paciente relatou que os dentes da prótese não apareciam ao sorrir, informou também usar PT há 40 anos. Ao exame clínico intrabucal, foi constatado que a paciente era desdentada total superior e parcial inferior. O plano de tratamento adotado foi a confecção de uma PT superior e PPR inferior. Iniciou-se com moldagem de estudo para ambos os arcos, e, após confecção de moldeira individual, fez-se moldagem funcional do arco superior. No inferior, após delineamento, classificou-se como Classe II Modificação 1 de Kennedy, e, definiu-se apoios e grampo em T no dente 43 e grampos circunferenciais simples no 33 e 38. Realizou-se então moldagem de trabalho com silicone de condensação em passo único. Na consulta seguinte adaptou-se o plano de orientação superior e armação metálica com cera para registro e montagem em articulador. A seguir, fez-se a prova dos dentes na cor BL2 no superior, a pedido da paciente, constatando-se oclusão satisfatória. As próteses foram acrilizadas e instaladas na próxima consulta.



RESULTADOS: Ao final do tratamento a opção reabilitadora mostrou-se eficaz, principalmente ao resolver a demanda estética observada pela paciente. **CONCLUSÃO:** O tratamento reabilitador por meio de próteses removíveis, quando obedece ao planejamento clínico e laboratorial, mostra-se satisfatório pois consegue devolver estética, função mastigatória e fonética, elevando a autoestima e o bom convívio social.

Palavras-chave: Prótese Total, Prótese Parcial Removível, Estética.

REFERÊNCIAS:

1. Munhoz EGA, Abreu CW. Os fatores que influenciam na satisfação do paciente submetido a tratamento de prótese total convencional. HU Rev. 2011 out-dez.;37(4):413-19.
2. Ellis JS, Pelekis ND, Thomason JM. Conventional rehabilitation of edentulous patients: The Impact on oral health-related quality of life and patient satisfaction. Journal of Prosthodontics. 2007 jan-feb.;16(1):37-42.
3. Trauth KGS, Orben A, Timboni D. Prótese parcial removível com encaixe extracoronário: relato de caso. J Orofac Invest. 2017;4(1):6-12.
4. Laport LBR, Figueira MG, Barbosa MT, Rodrigues CRT, Barbosa OLC. Reabilitação oral com prótese total e prótese parcial removível - relato de caso. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. 2017 set-nov.;20(1):108-114.