

NEOBEXIGA COMO DERIVAÇÃO URINÁRIA APÓS CISTECTOMIA TOTAL

INTRODUÇÃO: A cistectomia total pode ser realizada como forma de tratamento para condições malignas ou benignas, gerando a necessidade de derivação urinária que pode ser por meio da formação de uma neobexiga. **OBJETIVO:** Neste artigo busca-se analisar aspectos da neobexiga como forma de derivação urinária após cistectomia total. **MÉTODO:** Este trabalho consiste em uma revisão de literatura através das plataformas digitais Scielo e Google Scholar, com artigos de 2001-2012. **RESULTADOS:** Independente da técnica cirúrgica utilizada, a cistectomia radical afeta de forma considerável a vida do paciente. Porém, alguns estudos mostram que é oferecida qualidade de vida satisfatória aos pacientes que utilizam a neobexiga ortotópica. Um estudo de 2001 analisou 10 pacientes submetidos a alguma forma de derivação urinária. 4 (40%) tiveram boa qualidade de vida, 4 (40%) uma qualidade de vida satisfatória e 2 (20%) mostraram uma qualidade insatisfatória. Do total dos pacientes, 3 (30%) foram submetidos à neobexiga e os mesmos estão satisfeitos com a condição. Estudo de 2012 relata que pacientes podem apresentar incontinência noturna inicial e, eventualmente, permanente após a neobexiga, porém, preferem isso a apresentar um estoma. Outro estudo, de 2009, mostra que a cistectomia total com derivação urinária com formação de neobexiga apresenta mortalidade de 14%, considerada baixa quando comparada a cirurgia do conduto ileal, 21%. Além disso, foi visto que a taxa de infecção do trato urinário superior era menor na derivação urinária por neobexiga do que no conduto ileal (7,5% contra 26,5%). **CONCLUSÃO:** A neobexiga é uma boa opção para pacientes que passaram pelo procedimento de cistectomia radical. Apesar da possibilidade de alguns pacientes apresentarem sintomas indesejáveis, como incontinência noturna, por exemplo, a qualidade de vida fornecida pela neobexiga é satisfatória para a maioria dos pacientes a ela submetidos. Além disso, apresenta uma taxa de mortalidade menor que outras formas de derivações urinárias.

PALAVRAS-CHAVE: Cistectomia. Derivação urinaria. Bexiga.