

ANÁLISE DAS INTERNAÇÕES DE URGÊNCIA POR TUBERCULOSE MILIAR SEGUNDO FAIXA ETÁRIA NO BRASIL

Elisa Rodrigues Müller¹, Beatriz Bernaud Coelho¹, Cauan Tramontini Dias¹, Caroline Wilhelmsen Martins¹, Thiago Longo Moraes², Gabriel Ferreira Veloso³, Jéssica Manami Seki³

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), 2 Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

elisa.muller@ufcspa.edu.br

Introdução: O Brasil ocupa a 20ª posição mundial em incidência de tuberculose, a qual segue representando um problema de saúde pública e uma das doenças transmissíveis mais letais do mundo.¹ O presente resumo propõe-se a analisar de forma ampla as internações de urgência por tuberculose miliar no Brasil, buscando fornecer uma visão crítica acerca de tal forma de tuberculose e possíveis estratégias eficazes para prevenção. **Objetivo:** Analisar o perfil das internações por tuberculose miliar no Brasil, entre 2014 e 2023, com foco nas variações entre diferentes faixas etárias. **Metodologia:** Foram analisados os dados de morbidade do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), por meio do sistema TABNET, para internações por tuberculose miliar em caráter de urgência de janeiro de 2014 a dezembro de 2023. A análise contou como variável a faixa etária. **Resultados:** A análise mostrou um aumento relevante entre o ano de 2014 e 2023, de 71,76%, no número de internações por tuberculose miliar. A média de internações ao longo dos anos analisados foi de 558,9. A partir de 2021, o número de internações passou a ser acima da média, sendo que o ano com o maior índice foi 2022, com 773 hospitalizações. Em relação à faixa etária, as pessoas entre 30 e 39 anos foram as mais afetadas, com 1.134 internações ao longo de todo o período analisado, seguidas pelas faixas etárias de 40 a 49 anos e 50 a 59 anos, com 1.065 e 939 internações, respectivamente. **Conclusões:** Em vista dos resultados obtidos, é explícito que a tuberculose miliar continua a ser uma preocupação significativa de saúde pública, com um aumento substancial no número de internações ao longo do período analisado, destacando a urgência de medidas eficazes preventivas dessa forma grave de tuberculose. Os resultados destacam a necessidade contínua de investimento em programas de saúde pública voltados à tuberculose, incluindo campanhas de conscientização, melhoria do acesso ao diagnóstico e tratamento adequado, bem como medidas de melhoria para ambientes de maior transmissão.

Palavras-chave: Tuberculose. Emergência. Brasil.

Área Temática: Emergências Clínicas

Referências:

1. Cortez AO, Melo AC de, Neves L de O, Resende KA, Camargos P. **Tuberculosis in Brazil: one country, multiple realities.** J bras pneumol [Internet]. 2021;47(2):e20200119. Available from: <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20200119>