

## CHOQUE HIPOVOLÊMICO COMO COMPLICAÇÃO DE PLACENTA PRÉVIA ACRETA CENTRO TOTAL: UM RELATO DE CASO

**INTRODUÇÃO:** Placenta Prévia (PP) é o tecido se estendendo até o orifício interno uterino. Assim, necessitando de cesariana precoce, com risco de sangramentos. A PP deverá ser suspeitada em pacientes com idade gestacional (IG) superior a vinte semanas, além de sangramento vaginal, indicando-se ultrassonografia para localizar a placenta e determinar o manejo. **RELATO DE CASO:** TPNC, 33 anos, G4P2A1 (2 Cesarianas) com gestação ativa (IG: 22 semanas e 2 dias), sem comorbidades, admitida na maternidade com bolsa rota em enfermaria de alto risco. Realizada ultrassonografia obstétrica, demonstrando oligoâmnio, devido bolsa rota e presença de placenta prévia centro total. Quando questionada sobre sangramentos, relatou episódios prévios de pequena quantidade. Solicitou-se ressonância magnética (RM) para investigação de acrestismo placentário (PA). Mas, laudo apresentou nenhuma alteração, mantendo conduta conservadora. Posteriormente, iniciou sangramentos intensos, com taquicardia, edema, palidez cutâneo-mucosa e hipotensão. Indicando-se cesariana emergencial (IG: 28 semanas e 6 dias) com histerectomia subtotal. Neste procedimento houve dificuldade de dequitação, determinando placenta acreta durante intra-operatório. Encaminhada à UTI, evoluindo com abdome agudo hemorrágico e choque hipovolêmico refratário às drogas vasoativas e concentrados de hemácias. Realizada reabordagem cirúrgica com exérese de colo uterino. **DISCUSSÃO:** Observamos que o atraso no diagnóstico da PP e a PA despercebida na RM dificultaram o manejo do caso, pois, tais condições aumentam sangramento e complicações. Além disso, observou-se que a histerectomia subtotal foi responsável pelo agravamento do quadro hemorrágico, o qual poderia ter sido evitado, pois para placenta prévia é indicada histerectomia total. **CONCLUSÃO:** Portanto, a identificação precoce de alterações placentárias é importante para a evolução benigna, apesar do diagnóstico ser sensível aos exames de imagem, elas podem passar despercebidas, sendo imprescindível a suspeita clínica, sinais e sintomas, para manejo e evitar complicações.

**PALAVRAS-CHAVE:** Placenta Prévia. Placenta Acreta. Complicações na Gravidez.