

SIRINGOCELE DE COWPER EM PACIENTES IDOSOS

INTRODUÇÃO: A Siringocele de Cowper (SC) é dilatação dos ductos distais das Glândulas Bulbouretrais (Cowper) que drenam para uretra bulbar, com uma prevalência de 2-3% da população masculina. As glândulas de Cowper são órgãos acessórios para a função sexual e para defesa imunitária. A SC é usualmente assintomática. Uma vez sintomática, apresenta-se preponderantemente na infância masculina e manifesta-se com sintomas do trato urinário inferior: como sintomas irritativos, infecções urinárias recorrentes, hematúria e gotejamento terminal. O diagnóstico normalmente é realizado por meio de uretrocistografia ou cistoscopia. Quando sintomáticos, o tratamento padrão consiste em uretrotomia endoscópica. **RELATO DE CASO:** Homem de 69 anos referindo sintomas de trato urinário inferior, esforço miccional, gotejamento pós miccional e hesitação ao urinar. Na cistoscopia foi visualizado uretra anterior sem alterações e siringocele de cowper em uretra bulbar. Sendo assim, procedeu-se com a uretrotomia posterior com marsupialização da glândula de cowper. Paciente evolui de forma satisfatória, com resolução dos sintomas. **DISCUSSÃO:** A SC é mais comumente assintomática e presente em idades infanto-juvenis, com alguns trabalhos mostrando faixa etária média de 7.2 anos. As glândulas de Cowper estão situadas no bulbo do corpo esponjoso do pênis e estão conectadas à uretra masculina através de vários ductos. Os sintomas da SC são separados em dois grupos. SC perfuradas (não obstrutivas) apresentam sintomas como hematúria e gotejamento pós-miccional. Nos casos de siringoceles não perfuradas (obstrutivas), o paciente poderá apresentar edema perineal e esforço miccional. Apesar dessa classificação, é comum pacientes apresentarem sintomas mistos, o que dificulta o diagnóstico clínico. O tratamento da SC é essencialmente cirúrgico. **CONCLUSÃO:** Não é de nosso conhecimento casos clínicos com apresentação clínica sintomática em pacientes idosos. Nosso paciente evolui de forma satisfatória, com resolução dos sintomas urinários do trato urinário inferior.

PALAVRAS-CHAVE: Glândulas Bulbouretrais. Urologia. Sintomas do Trato Urinário Inferior.