

DOENÇA DE STILL DO ADULTO COM PADRÃO CUTÂNEO ATÍPICO: RELATO DE CASO.

Introdução: A Doença de Still do Adulto (DSA) é uma poliartrite crônica soronegativa associada a doença inflamatória sistêmica, que apresenta grande dificuldade diagnóstica, sendo um diagnóstico de exclusão, muitas vezes confundido com outros diagnósticos mais comuns. Os critérios de Yamaguchi são utilizados na classificação da DSA. A erupção cutânea característica, de aspecto maculo-papuloso, evanescente, eventualmente pruriginosa, que ocorre na maioria dos pacientes, é um dos critérios clínicos para o diagnóstico. Entretanto, formas atípicas de erupção cutânea e lesões urticariformes na DSA são descritas, o que faz necessário o alerta quanto a suspeição diagnóstica. **Relato do caso:** Paciente feminina, de 26 anos, com lesões urticariformes difusas, pruriginosas, de início súbito, disseminadas pelo corpo, e lesões secundárias a escoriação, acompanhadas de mialgia, poliartrite inflamatória, dactilite, febre e odinofagia. Exames laboratoriais com presença de leucocitose, com predomínio de neutrófilos. Proteína C Reativa, Velocidade de Hemossedimentação e Ferritina sérica elevados. Perfil imune apresentando Fator Antinúcleo e Fator Reumatoide negativos. Após hipóteses diagnósticas e tratamentos errôneos, foi levantada hipótese diagnóstica de DSA, para o qual a paciente preencheu os critérios classificatórios de Yamaguchi. **Discussão:** Dermatologistas e médicos clínicos precisam estar aptos a suspeitar de DSA, visto que o diagnóstico precoce pode ser decisivo na conduta e prognóstico. A suspeita de DSA deve ser feita na presença de erupções cutâneas atípicas ou mesmo na ausência de manifestações cutâneas, em quadro clínico e achados laboratoriais condizentes.

Declaro que não há conflito de interesse entre os autores do trabalho científico intitulado: "Doença de Still do Adulto com padrão cutâneo atípico: relato de caso" submetido no XXVIII Congresso Médico Acadêmico de Botucatu.