

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE RETALHO DE PEITORAL MAIOR COM PEDÍCULO EXTERNO NA RECONSTRUÇÃO FACIAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUÇÃO: O retalho miocutâneo (RMC) do músculo peitoral maior é uma das principais alternativas para as reconstruções de face e pescoço. Isto se deve por sua anatomia, pois é um retalho com longo arco de rotação, um pedículo neurovascular e suprimento sanguíneo axial excelentes, com resultados estéticos adequados devido à boa quantidade de tecido para as reconstruções. **OBJETIVO:** Descrever as vantagens da utilização do RMC de peitoral maior com pedículo externo nas reconstruções de face. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão de literatura qualitativa e descritiva, com coleta em bases de dados PUBMED. Foram incluídos artigos originais e revisões bibliográfica escritos na língua portuguesa ou inglesa. Foram utilizados os descritores (DeCS/MeSH), “Pectoralis major flap”, “face reconstruction”, “external pedicle” combinados com os operadores booleanos “AND”. **RESULTADOS:** A reconstrução dos defeitos da face com a utilização do RMC do peitoral maior com pedículo externo pode apresentar algumas vantagens a serem destacadas em relação ao pedículo interno. O tempo operatório desse procedimento pode reduzir, visto que há a retirada do tempo de confecção do túnel e de acomodação do retalho. As complicações da confecção do túnel, como hematoma e compressão do retalho, são descartadas, aumentando a chance de viabilidade do retalho. Além disso, o pedículo muscular, se seccionado em torno de 28 dias após reconstrução, pode evitar aumento de volume na região pré-clavicular. Entretanto, o procedimento deve contar ainda mais da cooperação do paciente no pós-operatório, principalmente em relação aos cuidados diários e movimentação da cabeça até a sua liberação. **CONCLUSÃO:** A reconstrução facial com a utilização de RMC de músculo peitoral maior com pedículo externo possui vantagens a serem analisadas na hora da confecção. Porém, a cooperação do paciente e os fatores que predispõem a viabilidade devem sempre ser analisados, como sexo, valores laboratoriais, tabagismo, estado nutricional, tamanho do defeito, entre outros.

PALAVRAS-CHAVES: Retalho de Peitoral Maior. Pedículo Externo. Reconstrução de face.