

## **IDENTIFICAÇÃO DE FATORES PREDITORES PARA PARTO VAGINAL EM GESTANTES COM CESÁREA ANTERIOR**

Objetivos: Identificar os fatores preditivos associados com o sucesso de parto vaginal em parturientes com cesárea anterior. Método: caso controle, retrospectivo e analítico. Incluídas todas as parturientes com antecedente de uma cesárea anterior de uma maternidade em dois anos. Inclusão: gestação única, termo, feto vivo e apresentação cefálica. Análise estatística: teste qui-quadrado e/ou Exato de Fisher, análise multivariada e significância de 5%. Resultados: incluídas 324 parturientes que evoluíram para parto vaginal, 329 para cesárea. Os fatores preditivos associados ao sucesso de parto vaginal: ausência de antecedente de hipertensão arterial crônica (OR= 3,76, IC95%: 1,61 - 8,79), pelo menos um parto vaginal anterior (1parto – OR= 2,33, IC95%: 1,43 - 3,79; 2 ou mais partos- OR= 5,03, IC95%: 2,77 - 9,14), dilatação cervical na admissão maior ou igual a 4cm (OR= 2,56, IC95%: 1,64 - 4,00), índice de Bishop na admissão maior ou igual a seis (OR= 1,66, IC95%: 1,06 - 2,60), trabalho de parto espontâneo (OR= 1,80, IC95%: 1,14 - 2,86) e recém-nascido com peso adequado ou pequeno para a idade gestacional (adequado: OR= 3,47, IC95%: 1,61 – 7,47; pequeno: OR= 4,01, IC95%: 1,54 – 10,43). Conclusões: Os fatores preditivos para parto vaginal foram o antecedente de partos vaginais, ausência de hipertensão arterial crônica, presença de trabalho de parto espontâneo, a dilatação cervical maior ou igual a 4cm, índice de Bishop favorável na admissão e recém-nascido com peso adequado ou pequeno para a idade gestacional.

Não há conflitos de interesse neste trabalho e sua apresentação.