

REPARAÇÃO CIRÚRGICA DE LOBÚLO FENDIDO

INTRODUÇÃO: O lóbulo da orelha é uma região vulnerável à lesão devido à sua composição tecidual, que não possui cartilagem. Geralmente, a dilaceração do lóbulo que culmina na separação das duas metades (lóbulo fendido) ocorre pelo uso de brincos pesados por tempo prolongado, alargadores de orelha ou pela força projetada ao retirá-los da orelha. Essa condição pode ser resolvida pela lobuloplastia, que consiste na reconstrução do lóbulo de orelha. **RELATO DE CASO:** Paciente do gênero feminino, 59 anos, diabética, apresentando lóbulo esquerdo bífido com 3 meses de evolução, associado à leve flacidez cutânea local. Foi submetida à correção cirúrgica, caracterizada por reavivamento de bordas e sutura, sob anestesia local e sem intercorrências. A paciente apresentou evolução satisfatória e, no 14º dia de pós-operatório, teve os pontos retirados e foi orientada a fazer uso de ácidos graxos essenciais, associado à massagem local, na cicatriz. A paciente recebeu avaliações seriadas por 1, 2 e 3 meses após a cirurgia. Neste último, encontrava-se satisfeita com o resultado e apresentava ferida operatória em ótimo aspecto e sem alterações cicatriciais, tendo recebido alta ambulatorial e permissão para furar a orelha. Não foram observadas complicações pós-operatórias locais durante todo o período de acompanhamento. **DISCUSSÃO:** A fissura do lóbulo da orelha (FLO) pode ser do tipo congênita, isquêmica, cosmética ou traumática e ser classificada como completa ou incompleta e uni ou bilateral. No caso da paciente, a FLO ocorreu devido à trauma local. Para reparação, a técnica de ressutura de bordas foi adotada, o que resultou não só na correção do lóbulo bífido, mas também na flacidez presente no local. Trata-se de técnica de simples execução, realizada em regime ambulatorial e com baixa taxa de complicações pós-operatórias. **CONCLUSÃO:** A técnica de ressutura mostrou-se eficaz, segura, de simples execução, baixa taxa de complicações e alto grau de satisfação.

Palavras-chave: Cartilagem da orelha. Deformidades adquiridas da orelha. Orelha.