

**ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
E FÓRUM CIENTÍFICO DO UNICERP  
EDIÇÃO 2020**

**QUALIDADE DE VIDA EM DISFAGIA PÓS-ACIDENTE VASCULAR  
ENCEFÁLICO**

DIOGO APARECIDO FERREIRA OLIVEIRA<sup>1</sup>, CLENDIA MICHELE BATISTA<sup>2</sup>.

E-mail: diogo-oliveira2.0@hotmail.com

<sup>1</sup>Graduando em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, Patrocínio-MG, Brasil; <sup>2</sup>Especialista em Atendimento Educacional Especializado pelo Centro Universitário de Maringá; Docente no Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, Patrocínio-MG, Brasil.

**Introdução:** A disfagia pode ser frequentemente observada em indivíduos com distúrbios neurológicos. Quando ocorre uma alteração no processo da deglutição, o indivíduo pode apresentar impacto variável na qualidade de vida, afetando uma das funções socioculturais mais básicas, que é a de comer e beber. **Objetivo:** Analisar o impacto causado pela disfagia orofaríngea neurogênica na qualidade de vida de uma população de indivíduos que sofreram AVE, visto que o prazer de se alimentar naturalmente encontrava-se prejudicado. **Metodologia:** Pesquisa descritiva, por ter como objetivo descrever as características de determinada população; transversal, por ter sido realizada em um único momento; quantitativa, por ser uma abordagem sistemática em que os resultados foram analisados com base em modelos matemáticos, constituída por 11 indivíduos, sendo o público alvo pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS), situados na cidade de Patrocínio-MG, utilizando o questionário Qualidade de Vida em Disfagia *SWAL-QOL* para a coleta dos dados. **Resultados:** Houve impacto na qualidade de vida de 100% dos participantes (n=11), porém observou-se impacto mais acentuado nos domínios: 1 – deglutição como um fardo (38,64%), 3 – tempo de se alimentar (44,32%), 6 – comunicação (44,32%) e 9 – social (41,82%), visto que, de acordo com o questionário Qualidade de Vida em Disfagia *SWAL QOL*, quanto mais baixa a pontuação, maior o impacto na qualidade de vida relacionada à deglutição. **Conclusão:** A análise da qualidade de vida relacionada à deglutição mostrou-se relevante para compreender o quão impactante é a disfagia neurogênica na vida desta população, bem como, no ambiente clínico pode auxiliar no monitoramento e motivação destes, a fim de alcançar as metas propostas para a reabilitação da deglutição.

**Palavras-chave:** Alimentação. Deglutição. Fonoaudiologia.