

CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA EM PACIENTES MASTECTOMIZADAS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUÇÃO: O cancer de mama é altamente incidente e o terceiro mais letal entre as mulheres. O tratamento inclui a mastectomia, afetando a imagem corporal, autoestima e qualidade de vida. A reconstrução mamária após mastectomia tem grande impacto psicossocial. **OBJETIVOS:** Revisar, demonstrar e discutir questões relacionadas à cirurgia plástica de reconstrução mamária em pacientes mastectomizadas. **MÉTODO:** Revisão narrativa da bibliografia por meio de pesquisa em base de dados (PubMed), utilizando-se para busca: “breast reconstruction on mastectomized patients”. De acordo com o filtro aplicado (textos completos, nos últimos dez anos) foram encontrados nove resultados. Os artigos foram triados e selecionados de acordo com critérios de inclusão (texto completo, últimos dez anos e coincidência com a citação utilizada) e de exclusão (texto apenas em *abstract*, fora do período estipulado, não coincidência com a citação de busca e artigos duplicados). Foi realizada extração dos dados e análise para redação da revisão. **RESULTADOS:** A cirurgia de preservação da mama tem um impacto mais favorável no bem estar geral, no papel físico, nas funções cognitivas, psicológicas e sociais e nos escores da escala de sintomas relatados nos estudos revisados. A autoestima, a atividade e satisfação sexual das pacientes tratadas com preservação da mama é menos afetada quando comparada às pacientes mastectomizadas. Existem dois grupos principais de técnicas reconstrutivas: uma reconstrução com implantes e uma reconstrução com tecido autólogo do paciente. Pacientes reconstruídos com tecido autólogo apresentam níveis de satisfação mais elevados do que aqueles reconstruídos com implantes. **CONCLUSÃO:** O câncer de mama pode provocar alterações físicas, psicológicas, funcionais e sociais e é um dos eventos mais traumáticos que podem ser vividos por uma mulher. É muito importante que o médico discuta as opções possíveis de tratamento em cada caso. No processo de tomada de decisão, a qualidade de vida deve ser levada em consideração.

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia Plástica. Mama. Pacientes.