

ARTRITE SÉPTICA DO QUADRIL EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO: A artrite séptica do quadril acomete principalmente crianças e consiste em inflamação na articulação causada por bactérias, sendo a *Staphylococcus aureus* a principal. Por ser doença agressiva, é essencial uma intervenção precoce e adequada.

METODOLOGIA: Revisão sistemática, nas bases de dados Pubmed, Scielo e Revista Brasileira de Ortopedia, no qual foram selecionados artigos em português e em inglês, entre os anos 2006 e 2021.

Descritores: artrite séptica do quadril e infecções articulares em crianças.

OBJETIVO: Analisar dados e estudos sobre artrite séptica do quadril em crianças.

DISCUSSÃO: A artrite séptica do quadril é uma inflamação aguda, devido a infecção por microorganismos, onde ocorre destruição articular, sendo mais comum em crianças. Os principais sintomas são dor localizada na região anterior do quadril que se irradia para o joelho, limitação do movimento na extremidade anterior no membro inferior e febre alta, sintoma constantemente ausente em neonatos, dificultando a conduta médica. Podem ser usados exames laboratoriais de contagem de leucócitos, taxa de sedimentação de eritrócitos e a proteína C reativa, que costumam estar aumentados. Além desses, a ultrassonografia também é utilizada. Deve ser feito diagnóstico diferencial com a sinovite transitória do quadril e com a artrite reacional. Se não tratada, pode evoluir para artrite degenerativa, limitação do crescimento e osteonecrose.

RESULTADOS: Segundo estudo feito nos EUA, essa patologia atinge quatro de 10.000 crianças de até 13 anos, sendo 40% dos casos no quadril. Assim, saber diagnosticar e tratar precocemente evita a progressão para lesões e deformidades permanentes da articulação do quadril.

PALAVRAS-CHAVE: Artrite Infeciosa. Articulação do Quadril. Criança.