

DESAFIO DIAGNÓSTICO DO CARCINOSSARCOMA ENDOMETRIAL

INTRODUÇÃO: Os carcinossarcomas uterinos são carcinomas metaplásicos compostos por elementos carcinomatosos e sarcomatosos. São tumores raros, que representam cerca de 3% das malignidades uterinas. Prevalentes em mulheres idosas, negras, obesas, nulíparas, e usuárias de estrogênio exógeno. Geralmente, têm sangramento vaginal e pólipos uterinos como primeiros sintomas. A curetagem uterina é um método propedêutico importante no diagnóstico, mas pode ser negativa em cerca de 25% dos casos. O prognóstico é reservado, e as recorrências são frequentes e precoces.

RELATO DE CASO: SLMAP, 69 anos, G3PC2A1, branca, menopausa aos 57 anos, sem terapia de reposição hormonal. Iniciou com sangramento uterino anormal e exteriorização de pólipos pelo orifício externo no colo uterino há 12 meses. Realizada ressecção de pólipos e anatomopatológico sem atipias. Manteve o quadro e, ao exame, apresentava útero aumentado e lesões vegetantes polipoides exteriorizando pelo colo do útero. Submetida a nova curetagem uterina. Anatomopatológico revelou pólipos endocervicais mucosos sem atipias. Submetida a histerectomia. Identificado útero aumentado de tamanho sem aderências e grandes lesões polipoides endometriais exteriorizando para vagina. Anatomopatológico de peça cirúrgica: carcinossarcoma. Submetida a quimioterapia e radioterapia. Apresentou quadro de recidiva peritoneal extensa e óbito 5 meses após.

DISCUSSÃO: Apesar de várias amostras endometriais negativas para atipias, a paciente mantinha a queixa de sangramento e recidiva rápida dos pólipos. A extensão da propedêutica com exame de imagem e cirurgia teve um papel determinante no diagnóstico e tratamento correto da paciente.

CONCLUSÃO: O carcinossarcoma é uma variante de alto risco do adenocarcinoma endometrial, e compartilha mais semelhanças com este, do que com sarcomas. O anatomopatológico, pode não ser preciso, devido às características morfológicas variáveis dessa neoplasia. A amostragem endometrial deve ser realizada em qualquer mulher com suspeita de adenocarcinoma do endométrio. No entanto, amostragem negativa não exclui essa malignidade e a avaliação adicional deve ser realizada.

PALAVRAS-CHAVE: Carcinossarcoma. Neoplasias endometriais. Pólipos endometriais.