

MANEJO CIRÚRGICO DE TUMOR NEUROENDÓCRINO DO PÂNCREAS NÃO FUNCIONANTE

INTRODUÇÃO: Os tumores neuroendócrinos do pâncreas são neoplasias que surgem das células que constituem as ilhotas pancreáticas, detectados mais comumente entre a quarta e a sexta décadas de vida. Eles são classificados como funcionais ou não funcionais. Os não funcionais são aqueles que não secretam hormônios ou secretam em quantidades mínimas que não resultam em uma síndrome. São diagnosticados incidentalmente em exames de imagem, com sintomas relacionados ao efeito compressivo local ou com doença metastática. O manejo cirúrgico é a base para seu tratamento curativo. As opções cirúrgicas evoluíram desde a ressecção oncológica estendida, até a ressecção poupadora do parênquima pancreático. **OBJETIVO:** O estudo visa analisar o manejo cirúrgico frente a um paciente portador de um tumor neuroendócrino do pâncreas não funcionante. **MÉTODO:** Trata-se de uma Revisão de literatura fundamentada nas publicações dos últimos 5 anos da base de busca Pubmed, assim como nos guidelines da sociedade europeia e grupo internacional de estudo pancreático. **RESULTADO:** Ao longo do estudo proposto, foram observados que o grau de diferenciação tumoral, estadiamento TNM e a presença de sintomas são definidores para o planejamento do manejo cirúrgico de pacientes com PNET não funcionante. **CONCLUSÃO:** A avaliação multidisciplinar e o entendimento das várias apresentações e comportamento biológico das lesões levam a definição cirúrgica e tratamento do paciente individualizado.

PALAVRAS-CHAVE: Tumores Neuroendócrinos. Não funcionais. Cirurgia.