

## PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DA ENDOMETRITE PUERPERAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

**INTRODUÇÃO:** A endometrite puerperal é a infecção da cavidade uterina, geralmente polimicrobiana, decorrida de invasão do miométrio com contaminação por microorganismos vaginais durante ou após o trabalho de parto. Os primeiros sintomas da endometrite são febre  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  e Tríade de Bumm (útero doloroso, hipoevoluído e amolecido), evoluindo para lóquios fétidos e calafrios. Apresenta diagnóstico clínico, maior incidência nas cesarianas, e suas complicações incluem choque séptico, histerectomia, tromboflebite pélvica e abscessos.

**OBJETIVO:** O trabalho tem como objetivo analisar a ocorrência de complicações maternas associadas à endometrite puerperal. **MÉTODO:** Foram usadas as bases de dados eletrônicas (MEDLINE, LILACS, PubMed e Cochrane) consultadas retrospectivamente até 2020. **RESULTADOS:** Foi observado, ao longo do estudo, que 94% das infecções puerperais ocorrem após alta hospitalar precoce, comprometendo a detecção. Mulheres que desenvolvem alguma complicação têm a sintomatologia inicial em casa e, provavelmente, só serão diagnosticadas horas depois, com piora do quadro. A evolução para histerectomia se mostrou prevalente, e os estudos apontaram forte associação entre intercorrências menstruais e de morbidade do colo uterino, e presença de laqueadura tubária antes dos trinta anos, como fatores de risco para histerectomia. Percebeu-se que o choque séptico é a forma clínica mais grave de infecção puerperal, sendo o ato cirúrgico e as lacerações de trato genital os principais sítios de origem, e a *E. coli* o principal agente responsável. A incidência da tromboflebite pélvica é estimada em 0,18%, e acrescida dos abscessos abdominais formam o quadro de complicações pós extravasamento cavitário. **CONCLUSÃO:** Portanto, esse estudo demonstrou que a endometrite enquadra-se como complicação puerperal de maior incidência, sendo a sepse sua complicação de maior gravidade. A prevenção e o diagnóstico precoce são importantes para evitar alguns fatores de risco proporcionando, assim, adequada assistência intraparto e à puérpera.

Palavras-chave: Cesárea, Endometrite, Parto, Período Pós-Parto.