

FATORES ASSOCIADOS COM O USO DO FACEBOOK ENTRE PORTADORES DE DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL

Introdução: As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) comprometem a integridade física e psicossocial de seus portadores, com repercussão na interação social. O objetivo do estudo foi caracterizar e identificar os fatores associados com o uso do Facebook (FB) entre portadores de DII. **Metodologia:** Estudo transversal com inclusão de 100 pacientes ambulatoriais. Uso do FB foi avaliado através do questionário Aspectos Psicossociais do Uso de Facebook (PSAFU), que compreende os domínios: uso compensatório, auto apresentação, socialização, vício e identidade virtual. Qualidade de vida foi avaliada através do SF-36 e do Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão foi utilizada para avaliar sintomas ansiosos e depressivos; escala de Autoestima de Rosenberg, para avaliar a autoestima. Estatística: testes de associação ($p < 0,05$) e correlação de Pearson. **Resultados:** Foram avaliados 46 pacientes com retocolite e 54 com Crohn; idade média: $33,71 \pm 10,08$ anos; 63% do sexo feminino. 68,69% dos pacientes buscaram informações sobre a doença na internet, 25% participaram de grupos de DII no FB e 82,61% acharam que isso ajudou a lidar com a doença (75%), com informações (78,95%) e na autoestima (33,33%). Os principais objetivos do uso do FB foram uso compensatório, auto apresentação e identidade virtual. Qualidade de vida avaliada pelo IBDQ, estado geral de saúde mensurado pelo SF-36 ($R = -0,22$; $p = 0,03$) e autoestima ($R = -0,21$; $p = 0,04$) foram associados com a pontuação do PSAFU. **Conclusão:** Pacientes com piores índices de qualidade de vida e de autoestima possivelmente usam o FB como forma de compensar uma interação social não virtual inadequada ou insuficiente.