

Tratamento da Flacidez Facial com Endolaser: Relato de Série de Casos

Osmar José Ferreira- Centro Universitário Barão de Mauá,
osmarestetica@gmail.com

Adriana Clemente Mendonça, Universidade Federal do Triângulo Mineiro-
UFTM

Marco Túlio Rodrigues da Cunha, Universidade Federal do Triângulo Mineiro-
UFTM

Sheila Clemente Mendonça D´Aloia, Mend Master – Cursos em Saúde,

Ana Carolina Matsuyama Coelho, Mend Master – Cursos em Saúde

Dayani de Paula, Mend Master – Cursos em Saúde

Suzana Fontanetti, Mend Master – Cursos em Saúde

Introdução: O endolaser para procedimentos minimamente invasivos tem se destacado no tratamento da flacidez facial, incluindo o Jowl. **Objetivo:** Relatar os resultados obtidos na aplicação do endolaser para tratamento da flacidez facial e melhora do aspecto do Jowl. **Tipo de Estudo:** Relato de série de casos. **Metodologia:** Cinco voluntárias do sexo feminino com idade entre 45 e 60 anos realizaram endolaser para tratamento da flacidez do 1/3 médio e inferior da face, (Delight®, 1470nm, modo pulsado, 10Hz, 60%, fibra de 400µm, com 4W de potência e dose média depositada de 6 a 15J/cm²). A região foi anestesiada previamente com lidocaína 2% diluída em soro fisiológico 2ml/20ml. Foram realizadas fotos e avaliado o edema e a dor. Estudo registrado na Plataforma Brasil CAAE: 74453723.8.0000.5154/ Parecer CEP: 6.332.806. **Resultados:** As voluntárias apresentaram edema que variou de leve a moderado pós-procedimento durante um mês e não relataram dor, considerando o resultado satisfatório e muito satisfatório no retorno de 90 dias. **Conclusão:** O endolaser, com os parâmetros realizados neste estudo, se mostrou um eficiente recurso para tratamento da flacidez do terço médio e inferior da face, incluindo o Jowl, com desconforto mínimo e boa aceitabilidade pelas voluntárias.