

OS IMPACTOS DA CIRURGIA DE QUADRIL NA RECUPERAÇÃO DE HABILIDADES DE ATIVIDADES EM PACIENTES IDOSO COM DEMÊNCIA

INTRODUÇÃO: Fratura de quadril associada a demência são um dos maiores desafios aos idosos, por si só as primeiras representam em média 50% das internações por trauma no pronto-socorro. Compreender essa relação permite melhores resultados diante dos processos adversos dessas condições, já que indivíduos que sofrem de demência/deficiência cognitiva correm um risco 2,7 vezes maior de sofrer uma fratura de quadril comparado aos que não sofrem. A mortalidade após uma fratura de quadril é de 5 a 8 vezes maior, sendo que 20% dos pacientes morrem no ano seguinte à fratura. **OBJETIVOS:** Analisar a recuperação do paciente com demência após fratura de quadril. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão sistemática no PubMed. Utilizaram-se os descritores "Hip fracture recovery" e "Dementia". Os filtros utilizados para inclusão foram: "in the last 10 years", "aged: 65+ years", "english" e "portuguese". Excluíram-se artigos duplicados, não concordância com o tema e trabalho não científico. Selecionou-se 17 artigos, 5 foram excluídos. **RESULTADOS:** Observou-se que uma anamnese bem feita é necessária para verificar se o paciente apresenta demência, auxiliando o trabalho multiprofissional no tratamento da fratura de quadril. Outrossim, verificou-se o papel da função cognitiva na recuperação das habilidades de atividades/atividades instrumentais da vida diária após cirurgia de fratura de quadril, sendo que quanto mais leve/moderada, melhor a recuperação do paciente Idoso. Por fim, importante frisar que essa doença, associada ao delírio, é uma das principais comorbidades do pós-operatório em pacientes idosos com esse tipo de fratura. **CONCLUSÃO:** É possível entender a fratura de quadril com a situação da demência está ligada a uma das principais causas de morbimortalidade dos pacientes idosos. Sendo assim, é imprescindível uma anamnese completa para identificar esse provável quadro demencial, podendo assim, posteriormente, relacionar com os possíveis acontecimentos que desencadeiam essa fratura em pacientes idosos e com piora do seu estado clínico.

Palavras-chave: Fratura de quadril, demência, idosos.