

CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

LEIOMIOMA VAGINAL EXUBERAL EM CADELA – RELATO DE CASO

FERREIRA, S. Q. B. S.¹, LIMA, A. S. R.¹, FURTADO, A. S.¹, COSTA, Y.M.¹, LOBATO, J. C. M.¹,
SOUZA L. C. K.¹, SOARES, J. C. S.¹, DA SILVA, G., R., M.²

¹Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). ²Universidade da Amazônia (UNAMA).
E-mail: sqferreira15@gmail.com

Leiomiomas são tumores benignos de musculatura lisa comumente observados nas regiões de vulva e vagina, geralmente são de crescimento lento, não invasivo e não metastático. São comuns devido influências hormonais que ocorrem durante o ciclo estral, principalmente em cadelas não castradas e de meia-idade pela constante estimulação do estrógeno, o que pode desencadear alterações ovarianas, mamárias e uterinas. O diagnóstico baseia-se no exame clínico, citológico e histopatológico. Nesse tipo tumoral, nota-se um aumento de volume na região perineal, prolapso dos lábios vulvares, tenesmo e em alguns casos a interrupção de cópulas em fêmeas intactas. Caracteriza-se pelo crescimento lento de uma massa encapsulada. O tratamento preconizado é a ressecção cirúrgica aliada com o ovário salpingo histerectomia (OSH), cujo prognóstico é bom. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de leiomioma vaginal em uma canina, cocker spaniel de 10 anos, inteira e pesando 10kgs. A paciente foi encaminhada para atendimento oncológico em setembro de 2020 apresentando aumento de volume em região perineal e sangramento intermitente. Durante o exame clínico a neoformação media 10cm de comprimento por 6 cm de largura. Foi solicitado citologia oncótica, que foi sugestiva de processo inflamatório. Diante do resultado, foram solicitados exames hematimétricos, ultrassonografia abdominal e eletrocardiograma para realização da biópsia incisional. A peça foi encaminhada para o exame histopatológico e o diagnóstico foi conclusivo de leiomioma. O tratamento indicado foi ovariosalpingohistectomia e ressecção local via episotomia. Entretanto, os tutores não autorizaram o procedimento cirúrgico e optaram pela terapia farmacológica com uso de anti-inflamatório e anti-hemorrágico com a finalidade de conforto e qualidade de vida. Assim, é possível observar que apesar da indicação cirúrgica ser o tratamento efetivo, ainda há dificuldade na aceitação por parte de alguns tutores.

Palavras – chave: neoplasia, histopatologia, episotomia.