

INCIDÊNCIAS DE INTERNAÇÕES POR ARTRITE REUMATÓIDE E OUTRAS POLIARTROPATIAS NO CENTRO-OESTE, POR IDADE E SEXO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS.

Pollyana Olímpio Azeredo¹; Mateus Moreira Lima¹; Juciele Faria Silva¹; Narryman Jordana Ferrão Sales¹; Ana Karla dos Santos Caixeta¹; Ana Laura de Freitas Nunes¹
Daniela Freitas de Oliveira¹; Ana Núbia de Barros¹; Eliane Gouveia de Morais Sanchez; Hugo Machado Sanchez¹

¹Universidade Federal de Jataí, curso de Fisioterapia, Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A artrite reumatoide é um tipo de poliartropatia inflamatória que afeta a membrana sinovial e a cartilagem em articulações periféricas, além de se manifestar também em outras estruturas extra-articulares. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), há prevalência dessa doença na faixa etária de 20-40 anos; no sexo feminino e em países desenvolvidos. As poliartropatias são afecções auto-imunes, que demandam manejo terapêutico medicamentoso e não medicamentoso, como a fisioterapia e o apoio psicossocial. Sem o tratamento adequado tais enfermidades se tornam progressivas e incapacitantes. **Objetivos:** Analisar a incidência de internações por artrite reumatoide e outras poliartropatias inflamatórias na região Centro-Oeste, considerando as variáveis de idade e sexo. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cuja fonte dos dados foi através do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), acessado em março de 2019. A população do estudo foi constituída por todos os casos notificados no Centro-Oeste, por internação devido artrite reumatoide e outras poliartropatias inflamatórias, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, considerando a influência das variáveis sexo e idade, entre as faixas-etárias de 1-79 anos. Os dados foram coletados pelo TABNET, e a análise estatística foi realizada através do software Microsoft Excel 2016. **Resultados:** Durante o período de 2017 a 2018, foram registradas 2.087 internações no Centro-Oeste. De acordo com a análise dos estados constata-se que a maior incidência foi registrada no estado de Goiás com 51%, seguido pelo Distrito Federal com 17,2%, o estado de Mato Grosso do Sul ficou com 17% e por final o estado de Mato Grosso com o menor registro de 14,6%. Na análise do sexo, os indivíduos mais acometidos foram do sexo masculino com 1.078 internações, sendo que no sexo feminino houve 1.009 do total. Com relação a influência da idade a menor incidência foi registrada entre 1-19 anos com 15%, seguida por 60-79 anos com 31,9%, e a maior predominância ficou registrada entre 20-59 anos com 53%. **Conclusões:** Diante os resultados, pode-se inferir que a maior incidência de internações por tais afecções ocorre em Goiás. Além disto, diferindo em parte dos dados da literatura, os resultados demonstram um predomínio no sexo masculino e na faixa etária de 20-59 anos. Portanto torna-se relevante práticas políticas de saúde em prevenção e promoção contra tais enfermidades, principalmente no estado de Goiás.

Palavras-Chave: Artrite reumatoide; inflamação; articulação.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Dados de domínio público.

Fonte financiadora: Não se aplica.