

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NOTIFICADOS X CONFIRMADOS NA REGIONAL DE SAÚDE DE PINHEIRO -MA ENTRE 2007 E 2017

Flávia Cristina Lima de Sousa¹; José Braz Costa Castro Junior¹; Lorena De Albuquerque Pinheiro de Oliveira¹; Domingos Carvalho Sodré²; Mayara Cristina Pinto Da Silva³.

¹ Acadêmicos de Medicina da UFMA – Pinheiro. ² Técnico de Laboratório da Secretaria de Vigilância em Saúde /MS-PHO, ³ Docente do Cursos de Medicina da UFMA - Pinheiro.

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por diversas espécies de protozoários do gênero *Leishmania*. As infecções causadas por esse gênero são, de modo geral, classificadas como leishmaniose tegumentar e leishmaniose visceral. A leishmaniose tegumentar americana (LTA) se caracteriza por ser uma doença formadora de lesões de pele, cartilagem e mucosas do trato respiratório superior. Nos últimos anos, ocorreu um aumento do dos casos e ampliação da ocorrência da LTA, sendo esta encontrada em todos os estados brasileiros sob diferentes perfis epidemiológicos. Objetivos: comparar os dados de LTA notificados na regional de saúde de Pinheiro disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com os dados de casos confirmados na Regional de Saúde de Pinheiro entre 2007-2017. Foi realizada pesquisa por faixa etária, sexo, ano de notificação e município de residência entre 2007-2017 dos casos notificados na Regional de Saúde de Pinheiro no SINAN e os casos confirmados por meio de escarificação da lesão e leitura microscópica na Regional de Saúde de Pinheiro devido à demanda espontânea. Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel. De acordo com o SINAN, dos 1316 casos, 51,4% tem entre 20-39 anos, 15,7% entre 40-59 anos e 14% entre 15-19 anos; 75,8 % são homens; 20,4% dos casos foram notificados em 2013, 15 % em 2012 e 14% em 2014; 32,1% são de Turiaçu, 13,9% de Pinheiro e 13,1% de Pedro do Rosário. Dos 107 casos confirmados na Regional de Saúde de Pinheiro, 52,3% tem entre 20-39 anos, 20,6% entre 40-59 anos e 8,4% entre 65-69 anos; 83,2% são homens; 12,1% dos casos foram confirmados em 2014, 10,3% em 2017 e em 2013; 27,1% são de Pinheiro, 15 % de Bequimão e de São Bento, 11,2% de Presidente Sarney. No Brasil, a LTA é uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção, devido à sua magnitude e pelo risco de ocorrência de deformidades que pode produzir no ser humano. Assim, é importante conhecer o perfil epidemiológico e o município de residência desse grupo de risco, que tanto no SINAN como nos dados dos casos confirmados na Regional de Saúde, encontra-se entre 20-39 anos e é do sexo masculino. Há diferença quanto ao ano e ao município de residência, sendo que no SINAN, Turiaçu e o ano de 2013 possuem mais casos e Pinheiro e o ano de 2014, com mais casos confirmados na Regional.

Palavras-chave: leishmaniose tegumentar americana, lesões de pele, regional de saúde de Pinheiro.