

AVALIAÇÃO CLÍNICA DE TUMOR DE KRUKENBERG NA GESTAÇÃO

Introdução: Tumor de Krukenberg é um tumor metastático no ovário com sítio primário mais comum no estômago, podendo ter origem também em cólon e outras áreas do trato gastrointestinal. Devido a sua raridade durante a gestação, pouco se sabe sobre seu comportamento nesse período, o que dificulta seu diagnóstico precoce. Assim, é importante entender a avaliação clínica dessa patologia, a fim de buscar um diagnóstico precoce da doença. **Objetivo:** Analisar o comportamento clínico do tumor de Krukenberg na gestação e descrever seus principais sinais e sintomas. **Método:** Revisão de literatura utilizando os descritores “krukenberg tumor” e “pregnancy”, e seus variantes em português, nas bases de dado PUBMED e SCIELO. **Resultados:** Como o principal sítio primário do Tumor de Krukenberg localiza-se no estômago, é importante atentar para sintomas como náuseas e vômitos, os quais também são muito comuns durante a gravidez, tornando a doença um desafio diagnóstico. Outros sinais demonstrados foram distensão abdominal, aumento súbito de massa abdominal e ascite. A dor abdominal e pélvica também foi encontrada, assim como sangramento vaginal, mas em menor incidência. Outro achado relatado foi a presença de hirsutismo, acompanhado ou não de virilização, que também inclui o aumento de acne e dos níveis de testosterona séricos. Em relação ao feto, podem ocorrer complicações como virilização, levando até mesmo à genitália ambígua, e também asfixia no caso de neoplasia avançada. **Conclusão:** Os sintomas do Tumor de Krukenberg podem ser facilmente camuflados pela gravidez e acabar sendo atribuídos a ela, o que atrasa o diagnóstico e piora o prognóstico da mãe e do bebê. Por conta disso, dor abdominal, ascite, persistência de hiperemese gravídica e virilização devem provocar o profissional da saúde a persistir com uma avaliação clínica detalhada na procura de diagnósticos diferenciais.

Palavras-chave: Tumor de Krukenberg. Gravidez. Ovário.