

## ESTRATIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PRECOSES PARA AMILOIDOSE DENTRO DO QUADRO CLÍNICO DO APARELHO LOCOMOTOR: UMA REVISÃO DE LITERATURA INTEGRATIVA

**INTRODUÇÃO:** Amiloidose é um termo genérico, englobando grupos de doenças caracterizadas por depósitos proteicos fibrilares extracelulares em tecidos resultando em perda funcional e morbimortalidade. O diagnóstico é frequentemente retardado devido às variações clínicas e a escassez de exames laboratoriais característicos. Assim, buscam-se evidências literárias sobre associação de sintomas musculoesqueléticos como manifestações precoces dessa patologia. **OBJETIVO:** Estratificar pela literatura recente os sinais do aparelho locomotor relativos à suspeição de amiloidose. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa embasada nas plataformas online PUBMED, SCIELO e BVS através das palavras-chave: amiloidose e diagnóstico precoce, tendo como critérios de exclusão o limite temporal de 5 anos, retirada de estudos duplicados e a triagem da temática: sinais e sintomas osteomusculares de suspeita e sua relação temporal com diagnóstico da síndrome amiloide, pela leitura dos títulos, resumos e texto integral. **RESULTADOS:** Foram obtidos 32 estudos pela pesquisa. A literatura aponta que: estenose espinhal lombar, ruptura atraumática do tendão do bíceps e síndrome do túnel do carpo, são os achados clínicos mais citados e associados como fatores de alerta e sinal precoce para a suspeita de amiloidose, com atenção especial para o último, que lidera sendo discutido em 26 estudos. As fontes também concordam que estes sinais clínicos do aparelho locomotor podem se apresentar cerca de 5 a 10 anos antes do diagnóstico de amiloidose. Entretanto, há carência de estudos sobre a prevalência dessa associação na população brasileira e de protocolos para abordagem e triagem dessas patologias em busca ao diagnóstico de amiloidose. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que os quadros osteomusculares citados não são totalmente específicos e nem estarão sempre presentes, contudo, possuem alta sensibilidade para suspeita de quadros de amiloidose, podendo anteceder em vários anos o diagnóstico. Ademais, mais estudos podem ser feitos para avaliar melhor a temática, sobretudo, com o grupo populacional de brasileiros.

**PALAVRAS-CHAVE:** Amiloidose; diagnóstico precoce; manifestações musculoesqueléticas;