

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR ENDOMETRIOSE EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA BAHIA - 2016 A 2020

. **INTRODUÇÃO:** A endometriose é caracterizada pela presença de tecido funcional semelhante ao endométrio localizado fora da cavidade uterina. A paciente pode ser assintomática, porém pode referir sintomas mais graves como dismenorreia severa, dispareunia profunda, dor pélvica crônica e sintomas urinários ou gastrointestinais, o que a faz buscar os serviços de urgência. Assim, faz-se necessário elucidar o perfil dessas pacientes para maior assistência na prevenção dos sintomas graves. **OBJETIVO:** Descrever o perfil epidemiológico das internações por endometriose em caráter de urgência na Bahia no período de 2016 a 2020. **MÉTODO:** Estudo epidemiológico, retrospectivo, realizado pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS), no período de 2016 a 2020. As variáveis de interesse foram cor/raça, faixa etária, média de permanência hospitalar e valor dos serviços hospitalares. Dispensou-se apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por terem sido utilizados dados públicos, sem identificação dos participantes. **RESULTADOS:** No período estudado foram registradas 538 internações de urgência na Bahia por endometriose. Dessas internações, 65,7% foi composta por mulheres pardas, 7,0% brancas, 3,5% pretas e 2,4% amarelas. Sobre à faixa etária, observou-se que 33,2% corresponderam às mulheres de 40 a 49 anos, 31,0% às de 30 a 39 anos, 14,6% às de 20 a 29 anos e 12,6% às de 50 a 59 anos. No total foram 1366 dias de internação custando R\$ 231.238,77 aos serviços de saúde, cerca de R\$ 727,59 por internação, com média de permanência hospitalar de 2,5 dias. **CONCLUSÃO:** O perfil epidemiológico dessas internações no período estudado foi caracterizado por mulheres pardas, na faixa etária de 30 a 49 anos. Permaneceram em média 2,5 dias no hospital e custearam R\$ 231.238,77. Esses resultados enfatizam a necessidade do sistema de saúde em aperfeiçoar a atenção primária dessas mulheres através de investimento no diagnóstico precoce a fim de prevenir o internamento por complicações da endometriose.

**PALAVRAS-CHAVE:** Epidemiologia; Endometriose; Urgência