



CONEXÃO UNIFAMETRO 2022

XVIII SEMANA ACADÊMICA

ISSN: 2357-8645

PERFIL DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR CIRURGIAS DE BEXIGA NEUROGÊNICA E FISIOTERAPIA NO PRÉ/PÓS CIRÚRGICO UROGINECOLÓGICO NO BRASIL

Luiza Amélia Ribeiro Ladeira¹

Thais Santos Marreiros¹

Patrícia da Silva Taddeo²

Natália Aguiar Moraes Vitoriano²

Discente – Centro Universitário Fametro – Unifametro¹

Docente – Centro Universitário Fametro – Unifametro²

luiza.ladeira@aluno.unifametro.edu.br

Área Temática: Promoção, Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde

Encontro Científico: X Encontro de Iniciação à Pesquisa

Introdução: A bexiga neurogênica é uma disfunção da bexiga, causada por lesões neurológicas. Os sintomas mais comuns são incontinência urinária, urgência e infecções. Dentre os tratamentos, encontram-se o medicamentoso, cirúrgico e conservador por meio da Fisioterapia uroginecológica. **Objetivo:** Verificar o perfil de internações, no período de 05 anos (2017-2022), a respeito do tratamento cirúrgico de bexiga neurogênica e atendimento fisioterapêutico em paciente no pré/pós cirurgias uroginecológicas no Brasil. **Metodologia:** Tratou-se de um estudo epidemiológico, descritivo e observacional, com abordagem quantitativa. A coleta dos dados foi feita em setembro de 2022 através de uma consulta no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS – DATASUS). Os procedimentos selecionados foram de atendimento fisioterapêutico em paciente no pré/pós cirurgias uroginecológicas e tratamento cirúrgico de bexiga neurogênica (eletivo e de urgência). Os dados foram analisados de acordo com o total de internações por Regiões/Unidade de Federação do Brasil, no período de Jul/2017-Jul/2022. Durante a pesquisa não houveram critérios quanto a cor/raça, sexo e idade. **Resultados e discussão:** Ao total, obteve-se 3.347 internações notificadas no Brasil, sendo o maior índice na Região Centro-Oeste com 49,2% (n=1.649). Seguido pela Região Nordeste 26,9% (n=901); Região Sudeste 20,8% (n=698); e Região Sul 1,7% (n=58). O menor índice de internações por tratamento cirúrgico de bexiga neurogênica e/ou atendimento fisioterapêutico em paciente no pré/pós cirurgias uroginecológicas foi a Região Norte com 1,2% (n=41). **Considerações finais:** O número de internações continua prevalente em todo o território brasileiro, consolidando, assim, a importância da fisioterapia no pré e pós cirurgias uroginecológicas.

Palavras-chave: Bexiga Urinária Neurogênica; Fisioterapia, Epidemiologia.



CONEXÃO UNIFAMETRO 2022

XVIII SEMANA ACADÊMICA

ISSN: 2357-8645

Referências:

BRASIL. Ministério da Saúde. Datasus: **Procedimentos Hospitalares do SUS 2017-2022** – Pré/pós cirurgias uroginecológicas Bexiga neurogênica. Brasília- DF. 2008. [Acesso em: 25 set 2022]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qiuf.def>

GARCIA, Daniela Oliveira; DOS SANTOS GIROTO, Elen Thais; DA COSTA, Daniely Leal. Tratamentos fisioterapêuticos para bexiga neurogênica: uma revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e434101624304-e434101624304, 2021.

GINSBERG, David. The epidemiology and pathophysiology of neurogenic bladder. **Am J Manag Care**, v. 19, n. 10 Suppl, p. s191-6, 2013.